# agricoles



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

## DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX RHÔNE-ALPES

Viticulture Bas-Vivarais

165, rue Garibaldi - Bâtiment B - B.P. 3202 - 69401 LYON Cédex 03 78.63.25.65

ABONNEMENT ANNUEL : 130 F - Régisseur Recettes DRAF Bulletin n° 1 - 15 Février 1989

AVIS aux abonnés : Suite au souhait de nombreuses coopératives, une édition BAS-VIVARAIS - VITICULTURE est créée, qui prend la suite de l'édition Bas-Vivarais de ces dernières années.

Les caves coopératives ont abonné un certain nombre de leurs adhérents. Renseignez-vous auprès de votre cave pour savoir si vous êtes abonné.

Si vous souhaitez prendre un abonnement individuel, complétez le coupon d'abonnement joint et renvoyez-le rapidement accompagné de votre règlement. Cet avis ne concerne pas nos observateurs Vigne Bas-Vivarais.

- EXCORIOSE : traitements à l'arsénite de sodium EUTYPIOSE : mesures préventives

Cette maladie est toujours en extension en Bas-Vivarais surtout sur les vignes les plus âgées et les vignes reformées. Des premières attaques peuvent avoir lieu dès l'âge de 6 ans et ensuite, si aucun traitement à l'arsénite de sodium n'est fait, la maladie s'étend chaque année.

Symptômes : En été, cette maladie se caractérise par un rougissement des feuilles (ou un jaunissement pour les cépages blancs) suivi d'un dessèchement des feuilles et des grappes jusqu'à la mort du cep.

L'évolution peut être foudroyante (apoplexie), les ceps meurent en quelques semaines en été. Dans d'autres cas on peut avoir une évolution plus lente durant plusieurs années avant la mort des ceps.

En hiver on peut reconnaître un cep mort d'Esca en faisant une coupe de la souche. Au centre de la coupe se trouve une zone claire de bois décomposé friable ayant l'aspect d'amadou.

Préconisations :

Dans les parcelles où des symptômes d'Esca ont été observés une lutte chimique est nécessaire pendant 2 à 3 années consécutives. La seule matière active efficace est l'arsénite de sodium à 1 250 g/hl. Les spécialités utilisables sont : Pyralesca RS, Pyralumnol 2000 et Pyral Rep Fort sur la base de 5 1/hl. Traiter sur des bois secs et en dehors des risques de gelée.

Pour limiter les risques de phytotoxicité il faut intervenir au moins 10 jours après la taille et 15 jours avant le début du gonflement des bourgeons. Ce traitement est également efficace contre l'excoriose.

Recommandations:

produit très toxique sodium L'arsénite de étant un scrupuleusement les conditions d'emploi indiquées sur l'emballage. D'autre part, il peut être très intéressant d'utiliser pour cette application des appareils à panneaux récupérateurs car cela limite les pertes de produit dans l'environnement (on peut récupérer jusqu'aux 2/3 de la bouillie).

Imprimerie de la Région RHONE-ALPES - Directeur Gérant : J.C. FAUDRIN - Commission Paritaire de Presse Nº 477 AD

EXCORIOSE

Cette maladie a subi une brusque progression en 1988, suite au printemps pluvieux. Elle se caractérise par des écorces blanchies avec des petits points noirs (pycnides). La base des sarments forme un renflement et se crevasse, les rameaux atteints cassent facilement à la base. Tous ces symptômes sont bien visibles actuellement dans d'assez nombreuses vignes du Bas-Vivarais.

Préconisations :

Le traitement contre l'Excoriose peut être fait en hiver avec un produit à base d'arsénite de sodium à 625 g de ma/hl (pour lutter en même temps contre l'Esca il faut doubler la concentration). L'arsénite de sodium est un produit dangereux, voir les précautions d'emploi dans le paragraphe

On peut également traiter l'Excoriose au moment du débourrement avec d'autres types de produits. Seules les parcelles fortement contaminées nécessitent traitement d'hiver et traitements de printemps. Dans les autres parcelles, privilégier les traitements de printemps.

EUTYPIOSE

Cette maladie est assez répandue localement en Bas-Vivarais. Les souches malades présentent en été une végétation buissonnante et rabougrie avec de petites feuilles. La mort de la souche se produit généralement au bout de plusieurs années. Une coupe d'un cep mort d'Eutypiose présente des zones marron de bois très dur.

Méthode de lutte préventive :

(pour stopper ou ralentir l'extension de la maladie)

La lutte contre cette maladie est difficile car il n'existe toujours pas de solution très efficace. Des expérimentations sont actuellement en cours pour tenter de mettre au point de nouvelles méthodes de lutte. En attendant, on conseille toujours les mêmes mesures :

- au moment de la taille :

. rendre l'opération la moins mutilante possible

. tailler les parcelles sensibles le plus tard possible par temps sec,

sans vent (éviter les périodes pluvieuses)

. protéger les plaies le plus tôt possible après la taille (dans les 24 heures) par application d'une bouillie à base de bénomyl ou carbendazime à la dose de 12,5 g de ma/l. Cette protection est préventive et elle ne permet donc pas de guérir un cep malade.

- après la taille :

. éliminer par brûlage les ceps ou bras morts et les bois de taille. Le broyage laisse sur place les ceps où se trouvent les sources de spores contaminatrices. Il est donc déconseillé dans les parcelles où sévit la maladie.

- en cours de végétation :

. éviter toute technique favorisant la vigueur, notamment sur jeunes

. repérer les ceps atteints pour les éliminer ou pour tenter un recépage à partir des repousses saines

Recépage des souches malades d'Eutypiose :

Quand un cep est partiellement atteint on peut tenter de le reformer à partir des pousses saines. Pour cela, il faut couper la partie malade en protégeant la plaie avec une pâte ou un mastic de protection (ne pas oublier de brûler les parties enlevées).

Sur un gobelet, il suffira de sectionner les cornes malades. Si toute la souche est atteinte, notamment pour les ceps taillés en Guyot, on peut tenter un recépage à partir d'une repousse vigoureuse de la base du cep.

DESHERBAGE DE LA VIGNE

Un prochain Bulletin fera le point sur les possibilités de lutte contre les dicotylédones résistantes et les graminées estivales avec le diuron fractionné et avec les nouveaux produits.

### AVERTISSEMENTS LES AGRICOLES en région Rhône-Alpes 6 nouvelles éditions :

- \* Les Bulletins d'Avertissements Agricoles renseignent les agriculteurs, techniciens et amateurs sur les méthodes de protection des cultures, les dates des traitements conseillés et les produits phytosanitaires autorisés.
- \* Les abonnements sont souscrits pour une période de 1 an du 1er Janvier au 31 Décembre 1989.
- \* Voici les nouvelles éditions et les cultures concernées :

Arboriculture Rhône-Alpes

: arbres fruitiers de toute la région

Viticulture Rhône-Alpes

(Drôme-Ardèche-Rhône-Loire-Isère-Savoie-Hte Savoie-Ain)

: vignobles de toute la région (sauf le Beaujolais qui

est traité dans une édition spéciale)

Viticulture Beaujolais

: vignobles du Beaujolais

Viticulture Bas-Vivarais

: vignobles du Bas-Vivarais (Sud Ardèche)

Grandes Cultures

: céréales à paille, mais, colza, cultures nouvelles

sur toute la région

Pépinières, Maraîchage, Jardins: cultures fruitières, ornementales et légumières

pour des professionnels ou des amateurs

# Tarif des abonnements pour 1989

	Tarif	individuel	Tarif collectif  pour au moins 10 abonnés par édition (joindre 1 seul chèque et la liste des adresses)
Arboriculture Rhône-Alpes		150 F	n x 135 F
Viticulture Rhône-Alpes		150 F	n x 135 F
Viticulture Beaujolais		130 F	n x 120 F
Viticulture Bas-Vivarais		130 F	n x 120 F
Grandes Cultures		150 F	n x 135 F
Pépinières, Maraîchage, Jardins		150 F	n x 135 F
			(n = nombre d'abonnés)

\* Association d'éditions différentes. Nous vous accordons un tarif préférentiel.

Arboriculture + Viticulture Rhône-Alpes	250 F
Arboriculture + Grandes Cultures	270 F
Arboriculture + Pépinières	270 F
Arboriculture + Beaujolais ou Viti Bas-Vivarais	250 F
Viti Rhône-Alpes + Grandes Cultures	
Viti Rhône-Alpes + Pépinières	270 F
Grandes Cultures + Pépinières	
Grandes Cultures + Beaujolais ou Viti Bas-Vivarais	
Pépinières + Beaujolais ou Viti Bas-Vivarais	250 F

- \* Autres associations : réduction de 10 % sur la somme des abonnements plein tarif.
- \* Liste de plus de 50 abonnés : réduction de 15 % sur le tarif individuel.
- \* Liste de plus de 200 abonnés : nous consulter.

# ABONNEMENTS - REABONNEMENTS 1989

Remplissez le coupon d'abonnement ci-dessous, cochez les cases choisies. Joignez un chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre du : REGISSEUR DES RECETTES D.R.A.F.,

et envoyez le tout au :

#### SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX B.P. 3202 69401 LYON CEDEX 03

Le Service de la Protection des Végétaux est situé à la Cité Administrative de la Part-Dieu - 165, rue Garibaldi - Bâtiment B - dans le 3ème arrondissement de Lyon. Tél.: 78.63.25.65.

- Pour les réabonnements, veuillez nous indiquer, si possible le code figurant sur l'étiquette-adresse de votre enveloppe (en haut à gauche de cette étiquette). Vous pouvez aussi découper cette étiquette et la joindre à votre envoi. Ceci facilitera l'enregistrement de votre réabonnement. Nous vous en remercions.
- \* Pour les listes collectives, envoyez-nous la liste des adresses des abonnés et un seul chèque.

## \* Remarque importante :

Les éditions Arbo-Viti ainsi que Bas-Vivarais ont été supprimées et remplacées par les éditions ARBORICULTURE Rhône-Alpes, VITICULTURE Rhône-Alpes et VITICULTURE Bas-Vivarais.

NOUVEL ABONNEMENT .	REABONNEMENT	<u>Code étiquette</u> :	
NOM :	Prénom :	Tél. :	
ADRESSE COMPLETE	:		
	I	Bureau distrib	uteur
Edition(s) choisie(s)	: ARBORICULTURE Rhône-Al	pes 150 F	
	2		
	VITICULTURE Rhône-Alpe		
	Viticulture BEAUJOLAIS	130 F	
	Viticulture BEAUJOLAIS VITICULTURE Bas-Vivara	130 F 130 F	
	Viticulture BEAUJOLAIS VITICULTURE Bas-Vivara GRANDES CULTURES	130 F 130 F 150 F	
	Viticulture BEAUJOLAIS VITICULTURE Bas-Vivara	130 F 130 F 150 F	